

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Артем

Возраст: 22

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 14.04.2025 21:49:24

формирования заключения врача: 15.04.2025 10:06:11

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: https://www.03uro.ru/consultations/question/319058/answer/319064



Заключение врача

Жалобы: Гемоспермия (примесь крови в эякуляте) после мастурбации.

Анамнез заболевания

- Пациент отмечает появление крови в сперме после мастурбации
- Длительность симптомов и частота эпизодов не указаны
- Данные обследований отсутствуют

Анамнез жизни

- Молодой возраст (23 года)
- Сопутствующие заболевания не указаны
- Особенности сексуальной жизни: практикует мастурбацию

Интерпретация данных

Гемоспермия у молодого мужчины чаще всего связана с:

1. Доброкачественными причинами (в 70% случаев):

- Микротравма уретры или простатической части
- Воспалительные процессы (уретрит, простатит)
- Конгестивные явления в малом тазу

2. Более серьезными состояниями (редко в этом возрасте):

- Камни простаты или семенных пузырьков
- Сосудистые аномалии
- Опухолевые процессы (крайне редко)

Рекомендации

1. По поводу мастурбации:

- Нет строгих противопоказаний к продолжению мастурбации
- Рекомендуется **умеренная частота** (1-2 раза в неделю) для наблюдения за динамикой
- Следить за характером эякулята (цвет, количество крови)

2. Обследования:

- Общий анализ мочи
- Спермограмма с исследованием на гемоспермию
- Микроскопия и посев секрета простаты
- УЗИ простаты и семенных пузырьков (ТРУЗИ), с определением объема остаточной мочи
- При повторных эпизодах консультация уролога очно

3. Наблюдение:

- о Отметить даты эпизодов гемоспермии
- Фиксировать связь с мастурбацией/половыми актами

• Обратить внимание на другие симптомы (боли, дизурия)

Дополнительная информация

Когда требуется очная консультация уролога:

- Если гемоспермия сохраняется более 2-3 эпизодов
- При появлении болей, затрудненного мочеиспускания
- Если кровь появляется не только в сперме, но и в моче

У молодых пациентов единичные эпизоды гемоспермии часто проходят самостоятельно. Однако **повторяющиеся случаи требуют обязательного обследования**.