

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Даниил

Возраст: 21

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 26.04.2025 16:14:34

формирования заключения врача: 28.04.2025 22:46:02

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://www.03uro.ru/consultations/question/319102/answer/319117>



Заключение врача

Жалобы

Пациент предъявляет жалобы на изменение размеров левого яичка (периодическое уменьшение и возвращение к нормальным размерам) после операции Иванисевича по поводу варикоцеле II степени слева, выполненной 10 февраля. Болевой синдром в настоящее время отсутствует.

Анамнез заболевания

После операции отмечались:

1. Болезненность при пальпации в раннем послеоперационном периоде
2. Наличие пальпируемого "комка вен" (вероятно, послеоперационный отек)
3. Полное исчезновение отека через 1 месяц
4. Появление текущего симптома — изменчивости размеров левого яичка

Анамнез жизни

- Варикоцеле II степени слева (оперировано)
- Возраст 21 год — период активного полового созревания и гормональной перестройки

Интерпретация представленных данных

Физиологические причины изменений размеров:

1. **Кремастерный рефлекс** — мышца, поднимающая яичко, может сокращаться в ответ на холод, стресс или физическую активность, временно изменяя положение и видимый размер яичка.
2. **Изменения кровенаполнения** после операции — перестройка венозного оттока может вызывать временные колебания объема.
3. **Послеоперационная адаптация** — лимфатический дренаж и микроциркуляция могут восстанавливаться до 3-6 месяцев.

Патологические причины, требующие исключения:

1. Рецидив варикоцеле (маловероятно в ранние сроки)
2. Гидроцеле (водянка оболочек яичка)
3. Нарушение лимфооттока

Заключение

Наиболее вероятно, что наблюдаемые изменения связаны с **физиологическими процессами послеоперационного восстановления** и индивидуальными анатомическими особенностями.

Однако для полного исключения патологических состояний рекомендуется контрольное обследование.

Рекомендации

1. **Контрольное УЗИ мошонки с доплерографией** — для оценки:
 - Размеров и структуры яичек
 - Состояния венозного сплетения
 - Наличия/отсутствия гидроцеле
2. **Самостоятельное наблюдение:**
 - Измерение размеров яичка в одинаковых условиях (например, утром после сна)
 - Фотофиксация изменений (при существенной разнице)
3. **Консультация оперировавшего хирурга** через 3 месяца после операции для планового осмотра.

Дополнительная информация

Как делать качественные фото для осмотра:

1. Используйте нейтральный фон
2. Обеспечьте хорошее освещение
3. Сделайте фото в двух проекциях (спереди и сбоку)
4. Для масштаба можно положить рядом линейку

Когда требуется срочная консультация:

- Появление боли
- Увеличение разницы в размерах более чем на 30%
- Покраснение или повышение температуры кожи мошонки