

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Александр

Возраст: 42

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 01.05.2025 19:38:38

формирования заключения врача: 01.05.2025 20:30:37

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://www.03uro.ru/consultations/question/319144/answer/319145>



Заключение врача

Жалобы

Пациент отмечает визуальное увеличение вен на половом члене без сопутствующих субъективных ощущений (боли, дискомфорта, зуда).

Анамнез заболевания

Постепенное усиление видимости венозного рисунка на половом члене с течением времени. Отсутствие болевого синдрома или функциональных нарушений (эрекция, мочеиспускание в норме).

Анамнез жизни

Возраст 43 года. Варикозная болезнь других локализаций не указана. Сопутствующие заболевания, травмы половых органов, операции в анамнезе не упомянуты.

Интерпретация представленных данных

Физиологический вариант: Усиление венозного рисунка может быть связано с возрастными изменениями кожи и подкожной клетчатки (истончение кожи, снижение эластичности).

Патологические варианты:

1. **Варикозное расширение вен полового члена** (редкая патология, обычно сопровождается дискомфортом)
2. **Лимфостаз** (при сопутствующем отеке)

Заключение

Наиболее вероятен **физиологический вариант** возрастных изменений. Для исключения патологии требуется уточнение данных.

Рекомендации

1. **Самообследование:**
 - Оценить симметричность венозного рисунка
 - Проверить наличие уплотнений по ходу вен
 - Отметить изменения при эрекции
2. **Консультация уролога очно** при появлении:
 - Болевых ощущений
 - Уплотнений

- Изменения формы полового члена

3. Общие рекомендации:

- Избегать травматизации
- Контроль артериального давления (при гипертензии может усиливаться венозный рисунок)
- Ношение свободного белья

Дополнительная информация

Когда стоит беспокоиться: если вены становятся узловатыми, появляется болезненность или изменение формы полового члена при эрекции.

Для наблюдения: рекомендуется делать сравнительные фото с интервалом 3-6 месяцев при одинаковом освещении и степени эрекции (при наличии изменений).