

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Юрий

Возраст: 35

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 04.05.2025 19:04:56

формирования заключения врача: 05.05.2025 07:46:46

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://www.03uro.ru/consultations/question/319161/answer/319170>



Заключение врача

Жалобы

Пациент предъявляет жалобы на появление **везикулёзных высыпаний** (прозрачных пузырьков) на основании полового члена, возникающих:

1. При жаркой погоде
2. После полового акта

После вскрытия пузырьков образуются **эрозии** (болячки).

Анамнез заболевания

Из описания следует:

- Симптомы носят **рецидивирующий характер** (повторяются)
- Локализация высыпаний **фиксированная** (на одном и том же месте)
- Провоцирующие факторы: **повышенная температура** и **механическое раздражение**

Анамнез жизни

Требуется уточнение:

1. Сроки появления первых симптомов
2. Частота рецидивов
3. Наличие подобных симптомов у полового партнёра
4. Использование презервативов
5. Наличие хронических заболеваний
6. Приём лекарственных препаратов

Интерпретация представленных данных

Описанная клиническая картина может соответствовать нескольким состояниям:

1. **Герпетическая инфекция** (ВПГ-2):
 - Характерны сгруппированные везикулы
 - Рецидивирующее течение
 - Провокация механическим раздражением
2. **Контактный дерматит**:
 - Реакция на средства гигиены/смазки
 - Связь с трением при половом акте
3. **Потница** (в жаркую погоду):
 - Мелкие прозрачные пузырьки
 - Локализация в складках

Заключение

Наиболее вероятные гипотезы:

1. **Рецидивирующий генитальный герпес** (требуется лабораторного подтверждения)
2. **Контактный дерматит** (требуется анализа используемых средств)

Для дифференциальной диагностики необходимо исключить ИППП.

Рекомендации

1. Неотложные действия:

- Исключить половые контакты до уточнения диагноза
- Не вскрывать пузырьки самостоятельно

2. Исследования:

1. ПЦР-исследование содержимого везикул на ВПГ-1/2
2. Анализ крови на антитела к ВПГ (IgG, IgM)
3. Общий анализ крови
4. Консультация дерматовенеролога

3. Общие рекомендации:

- Использовать хлопковое бельё
- Избегать перегрева
- Гигиена нейтральными средствами (pH 5.5)
- Исключить использование раздражающих средств (лубриканты, спермициды)

Дополнительная информация

Для качественной диагностики важно:

1. Сфотографировать высыпания в динамике (до и после вскрытия)
2. Отметить точные даты появления симптомов
3. Составить список используемых гигиенических средств

При появлении новых элементов рекомендую обратиться к врачу в течение 24-48 часов для забора материала на анализ.