

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Николай

Возраст: 41

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 21.05.2025 19:23:47

формирования заключения врача: 22.05.2025 11:20:09

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://www.03uro.ru/consultations/question/319243/answer/319248>



Заключение врача

Жалобы

Пациент предъявляет жалобы на **плохое заживление послеоперационной раны** в области уздечки полового члена после проведённого обрезания и удаления уздечки (16 дней после операции). Отмечает, что рана увеличивается в размерах на фоне применения Банеоцина.

Анамнез заболевания

16 дней назад выполнено обрезание крайней плоти и удаление уздечки. В послеоперационном периоде пациент отмечает замедленное заживление раны, несмотря на местное применение Банеоцина. **Сопутствующее заболевание** — сахарный диабет 2 типа, что может существенно влиять на процесс регенерации тканей.

Анамнез жизни

Сахарный диабет 2 типа (уточнить компенсацию — уровень гликированного гемоглобина, текущие показатели глюкозы крови).

Интерпретация представленных данных

Учитывая наличие сахарного диабета, замедленное заживление раны может быть связано с:

1. **Нарушением микроциркуляции и регенерации тканей** на фоне диабета.
2. **Возможным инфицированием раны** (несмотря на применение антибактериальной мази).
3. **Неадекватным местным лечением** (Банеоцин содержит антибиотики, но не всегда эффективен при глубоких или инфицированных ранах).

Важно оценить состояние раны визуально — наличие признаков воспаления (отёк, покраснение, гнойное отделяемое), некроза тканей.

Заключение

Наиболее вероятные причины замедленного заживления:

1. **Диабетическая ангиопатия и нарушение регенерации** (требует коррекции уровня глюкозы).
2. **Вторичное инфицирование раны** (может потребоваться замена местного антибиотика).
3. **Механическое раздражение раны** (например, трение об одежду).

Рекомендации

1. **Очная консультация уролога** — желательно у оперировавшего хирурга. Если нет возможности — обратиться к другому специалисту.
2. **Фото раны для дистанционной оценки** (см. инструкцию ниже).
3. **Контроль уровня глюкозы крови** — при диабете важно достичь целевых значений (желательно гликированный гемоглобин $<7\%$).
4. Избегать механического раздражения раны — носить свободное бельё из хлопка.

Как сделать фото раны для консультации

Для качественной оценки:

1. Используйте хорошее освещение (дневной свет или яркая лампа).
2. Сфокусируйтесь на ране — фото должно быть чётким, без размытия.
3. Сделайте 2-3 фото с разных ракурсов: общий вид полового члена и крупный план раны.
4. Избегайте теней — можно попросить кого-то помочь.
5. Не используйте вспышку вблизи — это может исказить цвета.

Дополнительная информация

При появлении следующих симптомов **срочно обратитесь к врачу**:

- Усиление боли, отёка или покраснения.
- Гнойные выделения с неприятным запахом.
- Повышение температуры тела.