

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Анастасия

Возраст: 23

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 28.05.2025 22:46:36

формирования заключения врача: 01.06.2025 14:08:06

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://www.03uro.ru/consultations/question/319280/answer/319293>



Заключение врача

Жалобы

Макрогематурия (кровь в моче визуально красного цвета), незначительная боль внизу живота со стороны установленного стента за день до появления гематурии.

Анамнез заболевания

Установка стента в мочеточник 3 месяца назад на фоне беременности. Роды 6 дней назад. Плановое обращение к урологу назначено через 3 недели после родов. Внезапное появление макрогематурии в течение суток после незначительных болей.

Анамнез жизни

Молодой возраст (24 года), недавние роды. **Ключевой фактор** – наличие уретерального стента, оставленного после беременности. Причина долговременной установки стента не указана.

Интерпретация представленных данных

Гематурия на фоне стента требует срочной оценки по нескольким причинам:

- **Стент может вызывать раздражение слизистой**, приводя к эрозиям сосудов
- Возможно **смещение стента** после родов из-за изменения анатомии
- Риск **инфекции мочевых путей** (стент служит проводником для бактерий)
- Не исключена **недиагностированная патология** (камень, стриктура), ставшая причиной первоначальной установки стента

Особую настороженность вызывает:

- Отсутствие удаления стента сразу после родов (нестандартная практика)
- Появление симптомов через 6 дней после родоразрешения

Заключение

Основные клинические гипотезы:

1. **Стент-ассоциированная гематурия** (механическое повреждение слизистой)
2. **Инфекционно-воспалительный процесс** (цистит/уретерит на фоне стента)
3. **Миграция или деформация стента** после родов
4. **Рецидив обструкции** (если стент оставлен по поводу мочекаменной болезни)

Рекомендации

1. Неотложные действия:

- Немедленно обратитесь в урологический стационар или вызовите скорую при:
 - Усилении боли или появлении лихорадки
 - Снижении диуреза (малом количестве мочи)
 - Образовании сгустков крови в моче
- **Не откладывайте визит до завтра** – гематурия со стентом требует срочной оценки

2. Обследования:

- Срочно: Общий анализ мочи с микроскопией осадка (используйте тест-систему **"Желтая бабочка"** для домашней оценки)
- УЗИ почек + мочевого пузыря с оценкой положения стента
- Обзорная урография для визуализации стента
- Посев мочи на флору

3. Консультации:

- Экстренный осмотр урологом с предоставлением информации:
 - Точная причина установки стента при беременности
 - Планируемая длительность ношения стента
 - Результаты последних контрольных обследований

Дополнительная информация

Важные уточнения для врача:

- Был ли стент установлен из-за гидронефроза беременных, мочекаменной болезни или иной патологии?
- Проводились ли контрольные обследования стента после родов?

Для домашнего наблюдения:

- Увеличьте потребление жидкости (1.5-2 л/сутки, если нет противопоказаний)
- Фиксируйте частоту мочеиспусканий и объем мочи
- Измеряйте температуру тела 2 раза/день