

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Андрей

Возраст: 42

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 17.06.2025 08:58:51

формирования заключения врача: 17.06.2025 11:26:18

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://www.03uro.ru/consultations/question/319894/answer/319938>



Заключение врача

Жалобы

1. **Жжение в мочеиспускательном канале** после эякуляции, продолжающееся 5-10 минут.
2. Ощущение, что **не вся сперма вышла** при эякуляции.
3. Дискомфорт носит **эпизодический или повторяющийся характер** (уточнить частоту).

Анамнез заболевания

1. Жалобы появились недавно (уточнить, сколько раз возникала ситуация, есть ли связь с определёнными обстоятельствами: половой акт, мастурбация, длительное воздержание и др.).
2. Ранее подобных ощущений не отмечал (уточнить).
3. Не указано, были ли сопутствующие симптомы: выделения из уретры, боль при мочеиспускании, кровь в сперме, повышение температуры, изменения цвета или запаха мочи.
4. Не сообщалось о перенесённых инфекциях, травмах, операциях на органах мочеполовой системы.

Анамнез жизни

1. Возраст — 42 года, пол — мужской.
2. Информация о хронических заболеваниях, приёме медикаментов, вредных привычках, особенностях сексуальной жизни и гигиены — **не предоставлена** (уточнить).
3. Не указано, были ли ранее урологические заболевания (простатит, уретрит, ИППП и др.).

Интерпретация представленных данных

1. Жжение после эякуляции может быть **вариантом нормы** при однократном эпизоде, особенно если отсутствуют другие симптомы (боль, выделения, кровь, температура).
2. Если ситуация **повторяется** или сопровождается другими симптомами, это может указывать на:
 - Воспалительные процессы (простатит, уретрит, везикулит)
 - Инфекции, передающиеся половым путём (ИППП)
 - Функциональные нарушения (застой секрета предстательной железы, особенности анатомии уретры)
 - Реже — мочекаменная болезнь, травмы уретры
3. Ощущение "неполного выхода спермы" может быть связано с **застойными явлениями** в предстательной железе или семенных пузырьках, а также с особенностями сокращения мышц тазового дна.
4. Для точной дифференцировки необходимы дополнительные данные: частота и длительность симптома, наличие других жалоб, результаты анализов.

Заключение

1. Если эпизод **единичный** и не сопровождается другими симптомами — вероятно, не требует вмешательства.
2. Если жалобы **повторяются** или усиливаются, вероятны:
 - Хронический простатит или простатовезикулит
 - Уретрит (в том числе скрытый)
 - Инфекции, передающиеся половым путём
 - Функциональные нарушения
3. Для подтверждения или исключения этих состояний требуется обследование.

Рекомендации

1. Если ситуация была **однократной** и не повторяется — наблюдение, соблюдение интимной гигиены, избегать переохлаждения и травм.
2. Если ситуация **повторяется или сопровождается другими симптомами**:
 - Обратиться к урологу для очного осмотра
 - Сдать анализы:
 - Общий анализ мочи
 - Мазок из уретры на флору и ИППП (хламидии, микоплазмы, гонорея, трихомонады и др.)
 - ПЦР-диагностика на основные ИППП
 - Анализ секрета предстательной железы (по показаниям)
 - УЗИ органов мочеполовой системы (предстательная железа, мочевого пузыря, почки)
 - Вести **Дневник мочеиспускания «ЭТТА»** (если есть нарушения мочеиспускания): [iOS](#) | [Android](#)
3. Не заниматься самолечением до получения результатов обследования.
4. При появлении **крови в моче или сперме, выраженной боли, температуры** — обратиться к врачу **немедленно**.

Дополнительная информация и инструкции

1. Для качественной дистанционной консультации рекомендуется:
 - Вести дневник симптомов (когда и при каких обстоятельствах возникает жжение, как быстро проходит, есть ли связь с половой активностью, мочеиспусканием, приёмом пищи или алкоголя).
 - Подготовить результаты анализов и УЗИ (если они есть).
 - При необходимости — сделать фото выделений (если появятся) для отправки врачу.
2. Если потребуется частый контроль анализов мочи — можно использовать **тест-систему «Желтая бабочка»** для экспресс-анализа мочи в домашних условиях.