

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Вадим

Возраст: 22

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 19.07.2025 10:33:58

формирования заключения врача: 19.07.2025 16:24:45

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://www.03uro.ru/consultations/question/322463/answer/322522>



Заключение врача

Жалобы

1. Тревога по поводу возможности наличия у партнёрши нескольких эмбрионов (многоплодной беременности) после повторных половых актов с эякуляцией во влагалище в течение одного менструального цикла.

Анамнез заболевания

1. Половые акты с эякуляцией во влагалище происходили каждые 3 дня в течение месяца.
2. Первое предполагаемое зачатие — 18 мая.
3. Крайний половой акт — 22 июня.
4. 17 июля партнёрша проходила УЗИ, на котором был выявлен один эмбрион.

Анамнез жизни

1. Возраст 22 года, сопутствующих заболеваний не указано.
2. Информация о менструальном цикле партнёрши и других особенностях не предоставлена.

Интерпретация представленных данных

1. Вопрос касается возможности возникновения многоплодной беременности (нескольких эмбрионов) при повторных половых актах в течение одного цикла.
2. УЗИ, проведённое через 2 месяца после предполагаемого зачатия, выявило только один эмбрион.
3. Тревога пациента связана с возможностью "добавления" новых эмбрионов после уже наступившей беременности.

Заключение

1. С точки зрения физиологии человека, **после наступления беременности** (то есть после оплодотворения и имплантации эмбриона) **новое зачатие невозможно** в рамках этого же цикла или уже наступившей беременности.
2. Многоплодная беременность (двойня, тройня и т.д.) формируется либо при одновременном оплодотворении нескольких яйцеклеток (двуяйцевые близнецы), либо при делении одного эмбриона (однойяйцевые близнецы). Это происходит в течение одного овуляторного цикла и **до имплантации** эмбрионов.
3. После наступления беременности организм женщины перестраивается: овуляция прекращается, новые яйцеклетки не выходят, и повторное оплодотворение невозможно.
4. В литературе описаны крайне редкие случаи так называемой "суперфетации" (повторное зачатие при уже наступившей беременности), но у человека это практически не встречается и считается казуистикой.
5. Если на УЗИ выявлен только один эмбрион, это достоверный признак одноплодной

беременности на данном сроке.

Рекомендации

1. **Причин для тревоги нет:** после наступления беременности новые эмбрионы не могут появиться в результате повторных половых актов.
2. Для контроля развития беременности партнёрше рекомендуется наблюдение у акушера-гинеколога и проведение плановых УЗИ.
3. Если есть дополнительные вопросы по развитию беременности, лучше обсудить их с врачом-гинекологом, ведущим беременность.
4. Беременность — естественный процесс, и повторное зачатие при уже наступившей беременности невозможно.

Дополнительная информация и инструкции

1. Если сохраняется тревога, можно повторить УЗИ через 2–4 недели для контроля развития беременности и исключения каких-либо особенностей.
2. В случае возникновения новых вопросов по мужскому здоровью, планированию семьи или репродуктивной функции — рекомендую обратиться к врачу-урологу или андрологу для очной консультации.