Информационно-
консультативный портал
для урологических пациентов
03 uro 18+

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Марина

Возраст: 63

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадеркина Виктория Анатольевна

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 23.04.2008 13:33:52

формирования заключения врача: 24.04.2008 08:27:15

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: https://www.03uro.ru/consultations/question/32467/answer/32468

Заключение врача

Уважаемая Марина! Прежде чем назначать лечение, необходимо обследоваться и выяснить причину учащенного мочеиспускания - в этом Вы совершенно правы. Диагноз гиперактивного мочевого пузыря устанавливает уролог, а не гинеколог, и тоже только после обследования. Сделайте общий анализ мочи, анализ на ЗППП (заболевания, передающиеся половым путем) методом ПЦР-диагностики, посев мочи на флору и чувствительность к антибиотикам, УЗИ почек и мочевого пузыря, уродинамическое обследование. Конечно, это займет время, но по крайней меребудет ясна причина и врачу будет легче определиться с назначением лечения. Выздоравливайте.