Информационно-
консультативный портал
для урологических пациентов
03uro 18+

# Телемедицинская консультация врача-уролога

## Пациент:

**Имя:** Галя

**Возраст:** 40

**Пол:** Женский

## Врач:

**ФИО:**

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

## Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 16.06.2008 17:06:48

**формирования заключения врача:** 17.06.2008 21:36:07

## Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** https://www.03uro.ru/consultations/question/34605/answer/34606

## Заключение врача

Здравствуйте, Галя. При возникновении частых мочеиспусканий, особенно у женщин, первым этапом необходимо исключить воспалительные заболевания мочеполовой сферы. Для этого необходимо сделать анализ мочи, желательно сделать посев мочи и чувствительность к антибиотикам, провести ультразвуковое исследование органов малого таза, обязательно проконсультироваться у гинеколога и исключить заболевания передающиеся половым путем. Только при отрицательных результатах данных исследований и анализов можно заподозрить гиперактивность мочевого пузыря. Для этого может потребоваться комплексное уродинамическое исследование, которое и даст ответы на все вопросы. Вы можете обратиться к нам в для обследования и при необходимости проведения лечения.