Информационно-
консультативный портал
для урологических пациентов
03 uro 18+

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: ирина

Возраст: 21

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 23.09.2003 12:00:00

формирования заключения врача: 23.09.2003 12:00:00

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: https://www.03uro.ru/consultations/question/362/answer/363

Заключение врача

Уважаемая Ирина! Симптомы, описанные Вами, могут быть проявлением специфического или неспецифического воспаления. Чтобы выяснить это и определиться с диагнозом, надо обследоваться на урогенитальную инфекцию (хламидии, микоплазмы, трихомонады,уреаплазмы, гарднереллы, кандиды), сдать общий анализ мочи, сделать УЗИ почек, мочевого пузыря, простаты. Но так как Вы с мужем уже начали курс антибиотикотерапии, то скорее всего все эти анализы будут неинформативными. Выход в подобной ситуации следующий - воздействовать на весь спектр урогенитальной флоры, т.е. принимать антибиотики широкого спектра действия. Сейчас Вы принимаете макропен - 7 дней, потом юнидокс солютаб (это доксициклина моногидрат) по 1 таб 3 раза в день - 7 дней и одновременно с ним метронидазол по 500 мг (2 таб) 3 раза в день - 7 дней, иммунал по 15 кап. 3 раза в день, линекс (т.к. возможно побочное развитие дисбактериоза). Весь курс расчитан на 14 дней, лечиться должны оба. После окончания лечения, через 1 месяц необходимо сдать вышеперечисленные анализы для контроля. Во время лечения и до получения результатов контроля, желательно воздержаться от половой жизни (презерватив не дает 100% гарантии) во избежание реинфицирования. После окончания курса лечения сообщите о результатах. Если есть ещё вопросы, буду рад помочь коллегам.