Информационно-
консультативный портал
для урологических пациентов
03uro 18+

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: марина

Возраст: 42

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадеркина Виктория Анатольевна

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 20.02.2008 20:16:00

формирования заключения врача: 20.02.2008 20:32:00

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: https://www.03uro.ru/consultations/question/36777/answer/36778

Заключение врача

Уважаемая Марина! Если У Вас прослеживается связь с половым контактом, то возможны два варианта. 1. Необходимо исключить заболевания, передающиеся половым путем (хламидии, трихомонады, микоплазмы, уреаплазмы, гарднереллы, кандиды). Если что-то обнаружится - пролечиться одновременно с половым партнером. 2. Если не будет ЗППП, то надо сдать посев мочи на флору и чуствительность к антибиотикам (на обычную флору). Тут связь с половым актом прослеживается таким образом - во время полового акта выделения из влагалища попадают на область наружного отверстия уретры, и потом восходящим путем в мочевой пузырь. Если Вам нужна консультация уролога в Москве - напишите мне на почту. Удачи!