Информационно-
консультативный портал
для урологических пациентов
03uro 18+

# Телемедицинская консультация врача-уролога

## Пациент:

**Имя:** Людмила

**Возраст:** 40

**Пол:** Женский

## Врач:

**ФИО:** Шадеркина Виктория Анатольевна

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

## Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 21.03.2008 23:50:00

**формирования заключения врача:** 22.03.2008 11:55:00

## Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** https://www.03uro.ru/consultations/question/37245/answer/37246

Москва, 2025

## Заключение врача

Уважаемая Людмила! У Вашего мужа и у Вас в организме присутствует один и тот же серотип (подвид) урогенитальной инфекции, который имеет одинаковую чувствительность к антибиотикам. Поэтому препараты (антибиотики) для лечения могут быть одинаковые, как у Вас, так и у Вашего мужа. Однако, у женщин начало лечения гинекологи привязывают к циклу месячных. Больше отличий не существует, не считая индивидуальную непереносимость препаратов (антибиотиков). Я не встречала научных (!) трудов, в которых бы нашли разницу в чувствительности урогенитальной инфекции в зависимость от пола исследуемого.

И самое основное - урогенитальной инфекций занимается не уролог (андролог), а венеролог.

Удачи!