

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Ольга

Возраст: 49

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадеркина Виктория Анатольевна

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 04.04.2008 11:40:00

формирования заключения врача: 04.04.2008 15:17:00

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://www.03uro.ru/consultations/question/37435/answer/37436>



Заключение врача

Уважаемая Ольга!

1. С целью профилактики воспалительных осложнений после трансуретральной резекции опухоли мочевого пузыря достаточно абактала. Дицинон - хороший препарат для отстановки кровотечения. Но за мочой надо следить. При усилении окраски мочи кровью, наличия сгустков крови, затрудненного мочеиспускания необходимо срочно обатиться к урологу.
2. На 2-3 недели после ТУР опухоли мочевого пузыря начинает отходить струп (корка) и возможно кровотечение различной степени выраженность.
3. Пока кровотечение не остовится ни химиотерапия, ни лучевую терапию при раке мочевого пузыря проводить нельзя.

Вам (Вашему отцу) надо находиться под постоянным наблюдением своего уролога. Удачи!