Информационно-
консультативный портал
для урологических пациентов
03 uro 18+

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Борис Борисович

Возраст: 88

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадеркина Виктория Анатольевна

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 07.11.2008 16:12:00

формирования заключения врача: 10.11.2008 07:24:00

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: https://www.03uro.ru/consultations/question/46699/answer/46700

Москва, 2025

Заключение врача

Уважаемый Борис Борисович! 1. Для уточнния причины учащенного мочеиспускания (инфекция, гиперактивный мочевой пузырь) надо выполнить общий анали мочи, посев мочи на флору, уродинамическое обследование, УЗИ мочевого пузыря с определением количества остаточной мочи. Если будет выявлена инфекция - надо пройти курс противовоспалительной терапии, если будет выявлен гиперактивный мочевой пузырь - проводить и далее лечение везикаром, спазмексом, дриптаном, альфа-блокаторами - тем, что рекомендует из этих препаратов Ваш лечащий врач. 2. После ТУРа достаточно часто возникает ретроградная эякуляция - ситуация, когда сперма при оргазме забрасывается в мочевой пузырь. Это действительно никакой для Вас опасности не представляет, просто психологический дискомфорт. 3. Утренняя эрекция - это нормально. Удачи.