

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Аркадий

Возраст: 37

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 08.08.2004 23:53:30

формирования заключения врача: 14.08.2004 08:50:28

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://www.03uro.ru/consultations/question/47463/answer/47464>



Заключение врача

Уважаемый Аркадий. В настоящее время причины раннего семяизвержения не определены. Тем более, что понятие "раннего" у всех разное. В медицине раннее семяизвержение определено, как семяизвержение - ранее, чем через 1 мин после введения полового члена во влагалище. Очень сомнительна его связь с простатитом. Любриканты с анестетиком продаются в сексшопах и имеют разнообразные названия. В аптечной сети продают "Инстиллагель", аэрозоль лидокаина. Хотеть увеличить половой член Вы конечно можете, только с помощью вакуумной помпы и колец это не удастся. Кроме этого нужно помнить, что в сексе важны не размеры, а умение. И уж совсем неразумно самостоятельное бесконтрольное использование половых гормонов.