Информационно-
консультативный портал
для урологических пациентов
03 uro 18+

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Владимир

Возраст: 45

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 10.08.2004 13:19:58

формирования заключения врача: 14.08.2004 08:55:57

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: https://www.03uro.ru/consultations/question/47477/answer/47478

Заключение врача

Уважаемый Владимир! Для периода «юношеской гиперсексуальности» очень характерны выраженная продолжительная эрекция, онанизм (часто многолетний), «струйный» выброс спермы. Многие мужчины продолжают периодически мастурбировать и после начала ведения полноценной половой жизни. С течением времени сперма при эякуляции может периодически выбрасываться с меньшей силой – «вытекать», что тоже является нормой. Может несколько ослабевать эрекция (в сравнении с тем как это было в 16-17 лет). Для 80% мужского населения нормальной продолжительностью полового акта является 2-3 минуты. У абсолютного большинства мужчин после первой эякуляции эрекция пропадает на какое-то время. Мастурбация сама по себе (если она не носит патологических форм) не причиняет вреда здоровью и не влияет отрицательно на фертильность (способность иметь детей). Ваши «страхи» в большей степени не обоснованы. Полагаю, что вы избавитесь от них с началом регулярной полноценной половой жизни. Тем не менее, подобная консультация носит заочный характер. В случае сохранения у Вас проблем в будущем, покажитесь урологу.