

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Лиза

Возраст: 40

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 20.09.2004 14:12:54

формирования заключения врача: 21.09.2004 20:32:18

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://www.03uro.ru/consultations/question/47717/answer/47718>



Заключение врача

Уважаемая Лиза! Вам необходимо сдать общий анализ мочи и бактериологическое исследование мочи для определения лейкоцитурии и уточнения характера и чувствительности микрофлоры. Это необходимо выполнить срочно до сдачи анализов. После этого Вы можете начать прием нолицина 400 мг. два раза в день + обезболивающие средства (кетанол в/м 3 раза в день по 1 ампуле) + но-шпа 2 т. 3 раза в день. После получения результатов бак. анализа мочи - лечение должно продолжиться прицельно. Помните!!! Лечение должно осуществляться под наблюдением врача, т.к. заочные консультации могут не помочь. Ваш врач видит Вас и Вашу проблему объективно, а мы ориентируемся на Ваши слова. А говорить Вы можете что угодно.