Информационно-
консультативный портал
для урологических пациентов
03uro 18+

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Ольга

Возраст: 20

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 03.10.2004 12:00:00

формирования заключения врача: 04.10.2004 19:13:40

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: https://www.03uro.ru/consultations/question/5592/answer/5593

Заключение врача

Уважаемая Ольга! Если у Вас есть дизурические явления, то они могут быть вызваны не только послецистоскопическим циститом. Подобные симптомы также могут быть проявлением камней нижней трети мочеточника, раздражением от стента (трубочки). Тактики ведения больных есть разные – от консервативного ожидания (как у Вас) до эндоскопических и открытых методов удаления камней. Стент установили с той целью, что по нему, как «по салазкам», фрагменты камней продвигаются в дистальную (нижнюю) часть мочеточника, а внутри стента отходит моча, предотвращая блок почки. Стенты могут стоять длительное время, иногда до нескольких месяцев. Можно эндоскопически уретеропиелоскопом зайти в мочеточник и где-то удалить камни щипчиками (вытащить), где-то контактно раздробить и т. д. Не думаю, что произойдет разрыв рубца, это достаточно редкое осложнение. Все надо решать индивидуально. Вам любым способом надо заинтересовать врачей собой и своим заболеванием, найти с ними контакт. Мы может только проконсультировать, но удалить камни и реально помочь мы не можем. Пишите, буду рад общению с Вами.

Шадёркин Игорь Аркадьевич