Информационно-
консультативный портал
для урологических пациентов
03 uro 18+

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Виктор

Возраст: 20

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 10.10.2004 16:17:19

формирования заключения врача: 10.10.2004 21:19:20

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: https://www.03uro.ru/consultations/question/5706/answer/5707

Заключение врача

Уважаемый Виктор! В Вашем случае виртуально лечение проводить нельзя, необходимо уточнить причину такого рода ощущений. Рези в мочеиспускательном канале могут быть вызваны кандидозом (в народе - молочница) после антибактериального лечения, выделением с мочой солей. Ухудшение струи мочи, учащенное мочеиспускание говорят в пользу воспалительного процесса в предстательной железе. Сдайте анализ на урогенитальную инфекцию (хламидии, трихомонады, микоплазмы, уреаплазмы, кандиды, гарднерелы), сделайте УЗИ (мочевого пузыря с определением количества остаточной мочи, предстательной железы), посев мочи на флору и чувствиетльность к антибиотикам. Пишите после получения результатов.