Информационно-
консультативный портал
для урологических пациентов
03 uro 18+

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Олеся

Возраст: 20

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 14.10.2004 13:54:07

формирования заключения врача: 14.10.2004 20:58:22

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: https://www.03uro.ru/consultations/question/5798/answer/5799

Заключение врача

Уважаемая Олеся! Уреплазма относится к урогенитальной инфекции, передающееся половым путем. Она вызывает воспалительные заболевания мочеполовой системы. При обнаружении этого вида инфекции у одного партнера, лечение назначается обоим партнерам одновременно, иначе эффекта от лечения не будет. Во время лечения и до получения отрицательного результата не рекомендуется жить половой жизнью. Связь с половыми контактами может быть в случае низкого расположения наружного отверстия уретры (т. е. если оно располагается близко к влагалищу). При этом во время или после половых актов инфекция попадает из влагалища в уретру, вызывая явления цистита. Это может быть не только при оральных, но и при обычных контактах. В подобных случаях рекомендуется принимать уросептики непосредственно после половых контактов однократно в небольших дозах. Обратитесь к урологу по месту жительства для назначения лечения.