Информационно-
консультативный портал
для урологических пациентов
03uro 18+

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Ирина 28 лет

Возраст: 21

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 20.10.2003 12:00:00

формирования заключения врача: 20.10.2003 12:00:00

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: https://www.03uro.ru/consultations/question/626/answer/627

Заключение врача

Уважаемая Ирина! Очень приятно, что Вы прислушались к моим рекомендациям. Моя схема лечения урогенитальной инфекции несколько отличается от схемы, выбранной Вашим врачом. Действительно, при таком типе инфекции (уреаплазмы и хламидии) непременно требуется проведение повторного курса. Для него также применяются антибиотики (отличные от тех, которые Вы принимали при первоначальном курсе), иммуностимулирующие препараты, общеукрепляющие, биопрепараты (бификол, бифидумбактерин – для профилактики дисбактериоза). Через 1 месяц после окончания лечения необходимо сдать контрольные анализы, но уже прицельно только на уреаплазмы и хламидии. Новых средств, сокращающих сроки лечения, применять не следует, т.к. при этой инфекции надо не сокращать сроки лечения, а искоренять причину заболевания, т.е. инфекцию. Дело в том, что уреаплазмы и хламидии очень сильно отражаются на репродуктивной функции женщин (способность воспроизводить потомство), до 40 % женского бесплодия вызывается именно урогенитальной инфекцией. Так что рекомендую прислушаться к назначениям Вашего врача и вылечиться от этого заболевания. Удачи Вам!