

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: сергей
Возраст: 20
Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич
Специализация: Уролог
Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 15.11.2004 15:26:05
формирования заключения врача: 16.11.2004 18:53:32

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://www.03uro.ru/consultations/question/6304/answer/6305>



Заключение врача

Уважаемый Сергей! В некоторых случаях бывает, что соскоб из уретры не показывает присутствия инфекции в организме, для этого берут другой материал (кровь). В таких случаях необходимо сделать провокацию за сутки до обследования внутримышечно вводится 0,5 мл гоновакцины. За два часа до обследования не рекомендуется мочиться и проводить гигиенических процедур. К урогенитальным относятся следующие инфекции: хламидии, микоплазмы (2 вида), уреаплазмы (2 вида), гарднереллы, кандиды, трихомонады, гонококки, вирус простого герпеса, вирус папилломы человека, и другие. Они могут длительное время бессимптомно сохраняться в организме, случайно обнаруживаясь при обследованиях. Удачи!