

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Светлана

Возраст: 20

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 16.11.2004 15:50:00

формирования заключения врача: 18.11.2004 20:29:02

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://www.03uro.ru/consultations/question/6324/answer/6325>



Заключение врача

Уважаемая Светлана! Кисты, как правило, бывают ретенционными и обусловлены облитерацией (закупоркой) выводных протоков желез, располагающихся в слизистой оболочке. Возникновению кист могут способствовать перенесенные воспалительные заболевания (уретриты различного происхождения), травмы и т. д. Кисты чаще всего одиночные, небольших размеров, склонны к увеличению. Симптоматика долгое время может быть стабильной, стертой. При инфицировании кисты возникают признаки острого гнойного воспаления с образованием свища, открывающегося в просвет мочеиспускательного канала или наружу. У женщин кисты чаще всего локализуются около наружного отверстия мочеиспускательного канала. Небольшие кисты удаляют путем вылушивания. Обратному развитию киста, как правило, не подвергается. Что касается осложнений хирургического лечения кист, то, Света, Вы понимаете, что в умелых руках риск развития осложнений минимален. Если киста не препятствует ведению половой жизни, то никаких противопоказаний к половой жизни нет. Пишите, если будут еще вопросы.