Информационно-
консультативный портал
для урологических пациентов
03 uro 18+

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Нешев Семен

Возраст: 21

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 24.10.2003 12:00:00

формирования заключения врача: 24.10.2003 12:00:00

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: https://www.03uro.ru/consultations/question/668/answer/669

Заключение врача

Уважаемый Семен! В таком возрасте, как у Вашего отца, грыжи возникают из-за слабости апоневроза. Что касается консервативных методов лечения (т.е. неоперативных), то их нет, единственное – ношение бандажа, но это не лечение, а способ немного облегчить своё состояние. К сожалению, после операций грыжесечения иногда бывают рецидивы, причем количество рецидивов не зависит ни от квалификации хирурга, ни от способа оперативного вмешательства (рецидивы грыж бывают даже у мэтров хирургии). Это зависит от особенностей организма пациента. Если грыжа сильно беспокоит, то её лучше прооперировать в плановом порядке, а не ждать, когда она ущемится.