Информационно-
консультативный портал
для урологических пациентов
03uro 18+

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Ольга

Возраст: 20

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 23.12.2004 14:08:38

формирования заключения врача: 23.12.2004 20:21:47

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: https://www.03uro.ru/consultations/question/6892/answer/6893

Заключение врача

Уважаемая Ольга! Пиелоэктазия – это небольшое расширение лоханки почки. Пиелоэктазия может развиться в результате воспалительного процесса (например при пиелонефрите), в результате нарушения оттока мочи (при нефроптозе). Лечение зависит от причины развития пиелоэктазии (лечение воспалительного процесса). Трудно сказать, чем вызвана такая большая разница в размерах почек. Возможно, что это какие-то погрешности исследования. Обычно я рекомендую своим пациентам делать (конечно, по возможности) УЗИ в одном и том же месте (на одном и том аппарате, у одного и того же специалиста). Этим погрешности сводятся к минимуму. Пишите, если будут еще вопросы, буду рад Вам ответить.