

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Сергей

Возраст: 66

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 23.12.2008 14:09:48

формирования заключения врача: 23.12.2008 23:04:10

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: https://www.03uro.ru/consultations/question/69297/answer/69298



Заключение врача

Уважаемый Сергей! Промывать мочевой пузырь можно и 50мл шприцем. Вводится 2 шприца (100 мл) стерильного фурацилина, потом шприц отсоединяется и весь фурацилин выпускается в мочеприемник. Так повторить 2-3 раза. Всего при нормальном отхождении мочи, отсутствии гноя в моче промывать достаточно 1 раз в сутки. Уретральный катетер должен быть установлен в мочевой пузырь не более, чем на 10 дней. Если за этот период самостоятельное мочеиспускание не восстановится, нужно рассмореть вопрос либо об интермиттирующей катетеризации, либо о наложении эпицистостомы. Все эти вопросы надо решать не заочно. Обратитесь к урологу по месту жительства. Удачи!