Информационно-
консультативный портал
для урологических пациентов
03uro 18+

# Телемедицинская консультация врача-уролога

## Пациент:

**Имя:** Майя

**Возраст:** 39

**Пол:** Женский

## Врач:

**ФИО:** Шадеркина Виктория Анатольевна

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

## Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 04.01.2009 09:50:00

**формирования заключения врача:** 04.01.2009 10:01:00

## Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** https://www.03uro.ru/consultations/question/70578/answer/70579

## Заключение врача

Уважаемая Майя! На мой взгляд, у Вас не выяснена причина учащенного мочеиспускания - воспаление мочевых путей, инфекция, гиперактивный мочевой пузырь и т.д. Следовательно, у Вас нет диагноза. Если кишечную палочку нашли в кале, то это вариант нормы. Если Вы ее обнаружили в моче - тогда другое дело. Вам необходимо выполнить обследования на ЗППП, посев мочи на флору, общий анализ мочи, урофлоуметрию, УЗИ почек и мочевого пузыря с определением количества остаточной мочи. Я понимаю, что для Вас это трудно, но это необходимо для полноценной диагностики Вашего заболевания. Лечение заочно назначать нельзя по многим причинам - без осмотра, без диагностики, и плюс Ваша индивидуальная реакция на препараты в виде одышки. Длительность курса определяется индивидуально также после выполнения обследований, т. к. инфекция мочеполовых путей бывает разная. Поэтому, обратитесь по возможности к урологу очно. Выздоравливайте.