



## Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

**Имя:** Виталий Н.

**Возраст:** 21

**Пол:** Женский

Врач:

**ФИО:** Шадёркин Игорь Аркадьевич

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 28.10.2003 12:00:00

**формирования заключения врача:** 28.10.2003 12:00:00

Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://www.03uro.ru/consultations/question/708/answer/709>



## **Заключение врача**

Уважаемый Виталий! Такое состояние называется фимозом (сужение крайней плоти). Помимо того, что это доставляет массу неудобств в половой жизни, и иногда делает её невозможной, при фимозе часто возникают баланопоститы (воспаление головки полового члена и крайней плоти) вследствие присутствия постоянного очага инфекции. Кроме того, смегма обладает канцерогенными свойствами (способствует возникновению атипичных клеток) и может вызывать рак головки полового члена. Учитывая все вышесказанное, Вам лучше всего сделать операцию иссечения крайней плоти (циркумцизию). Операция не относится к разряду сложных, длится около 10 мин. Делают её в любом урологическом отделении любой муниципальной больницы, а также в частных клиниках. В обычных больницах бесплатно, в частных клиниках – цены разные. Удачи!