

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Александр

Возраст: 46

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадеркина Виктория Анатольевна

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 07.01.2009 16:57:00

формирования заключения врача: 07.01.2009 18:30:00

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: https://www.03uro.ru/consultations/question/70982/answer/70983



Заключение врача

Уважаемый Александр! <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

- 1. Длительное стояние уретрального катетера у мужчин не рекомендуется в связи с развитием целого ряда осложнений стриктуры (сужения) уретры, хронического простатита, эпидидимита и т.д. Кроме того, при длительном стоянии уретрального катетера нет возможности тренировки мочевого пузыря (чтобы потом восстановилась функция самостоятельного мочеиспускания), контроля его функциональной емкости.
- 2. При прогнозируемой длительной катетеризации мочевого пузыря необходимо рассмотреть вопрос со своим лечащим урологом либо об установке эпицистостомы, либо о интермиттирующей (периодической) катетеризации.
- 3. Гематурия в Вашем случае обусловлена аррозией сосудов мочевого пузыря, эрозией самой слизистой, мочекаменной болезнью, хроническим воспалительным процессом в мочевом пузыре.
- 4. Для решения вопроса о дальнейшем Вашем урологическом лечении, надо выполнить следующие обследования: общий анализ мочи, посев мочи на флору, общий анализ крови, креатинин, мочевина, УЗИ (почек, мочевого пузыря), обзорный ренген-снимок мочевого пузыря, КУДИ (комплексное уродинамическое исследование).
- 5. Если будет принято решение об эпицистостомии, то Ваш уролог должен ознакомить Вас с принципами ухода. Катетер (тоже Фолея) надо менять каждые 2 недели. Если будет принятол решение об интермиттирующей катетеризации, то необходимо использовать специальные одноразовые стерильные катетеры с антисептическим покрытием. Удачи.