

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Илья

Возраст: 35

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 08.01.2009 14:56:37

формирования заключения врача: 09.01.2009 14:16:37

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://www.03uro.ru/consultations/question/71139/answer/71140>



Заключение врача

Уважаемый Илья! Фимоз является аномалией развития наружных половых органов, в последнее время встречается часто. Фимоз – это сужение крайней плоти, препятствующее освобождению головки из препуциального мешка. При фимозе внутри препуциального мешка скапливается беловатое сальное вещество – смегма, продуцируемое железами, расположенными на головке полового члена. Смегма может сгущаться, инкрустироваться солями, а при присоединении инфекции – разлагаться, вызывая воспаление головки полового члена (баланопостит), что в дальнейшем может привести к развитию рака головки полового члена. При выраженном фимозе показана операция - циркумцизио – иссечение крайней плоти. Осложнением фимоза является парафимоз – ущемление головки полового члена, который может привести к некрозу (омертвлению) головки полового члена. Если такое возникнет, то потребуются срочное хирургическое вмешательство. Необходимость в оперативном лечении фимоза определяет врач уролог, возраст значения не имеет. Вам надо обратиться к урологу для осмотра. Удачи!