Информационно-
консультативный портал
для урологических пациентов
03 uro 18+

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Женя

Возраст: 35

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 21.01.2009 16:53:14

формирования заключения врача: 22.01.2009 16:30:44

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: https://www.03uro.ru/consultations/question/72729/answer/72753

Москва, 2025

Заключение врача

Уважаемый Евгений Владимирович! Это может быть **относительный фимоз**, т.е. сужение крайней полоти не выраженное и проявляется себя только при увеличении полового члена во время эрекции. Если это так, то такое состояние требует оперативного лчения (обрезание или пластика крайней плоти). Однако точно можно сказать только после осмотра полового члена. Вам надо обратиться на очный прием к урологу. Вы так же можете сделать фотографии члена во время эрекции при "закрытой" и "открытой" головки полового члена, на которой будет видно сдавление крайней полотью головки полового члена и прикрепить их к новому вопросу в качестве прикрепленного файла. Удачи!