

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Лариса

**Возраст:** 20

**Пол:** Женский

### Врач:

**ФИО:** Шадёркин Игорь Аркадьевич

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 20.01.2005 21:43:33

**формирования заключения врача:** 22.01.2005 21:13:45

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://www.03uro.ru/consultations/question/7348/answer/7349>



## Заключение врача

Уважаемая Лариса! Причин развития гиперактивного пузыря очень много. Гиперактивный мочевой пузырь является клиническим проявлением гиперактивности детрузора, которая заключается в непроизвольном сокращении при наполнении мочевого пузыря. Причины делятся на нейрогенные (болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, остеохондроз, ушиб спинного мозга, последствия операций на позвоночнике и многие др.) и идиопатические. К последним относятся анатомические, миогенные, сенсорные (чувствительные) нарушения, инфравезикальная обструкция (нарушения оттока мочи, вызванные непроходимостью мочевых путей ниже мочевого пузыря), возраст. Истинную причину гиперактивности мочевого пузыря иногда установить очень трудно. В таких случаях проводят тест-терапию гиперактивности. Все вопросы необходимо решать индивидуально. Удачи!