

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: марина

Возраст: 41

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадеркина Виктория Анатольевна

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 27.01.2009 10:27:11

формирования заключения врача: 28.01.2009 17:40:50

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://www.03uro.ru/consultations/question/74297/answer/74298>



Заключение врача

Уважаемый марина! 1. Пиелозктазия справа при беременности возникает из-за того, что правая почка наиболее подвержена изменениям при беременности (анатомическая особенность беременной матки - чаще отклоняется вправо, сдавливая правый мочеточник, плюс гормоны беременной женщины расслабляют мочеточник, нарушая отток мочи из почки). 3. В Вашей ситуации надо обратиться к урологу, выполнить общий анализ мочи, посев мочи на флору, биохимический анализ крови (креатинин, мочевины). При нарастании гидронефроза - его разрешение (нефростомия, стентирование). 4. Сейчас - позиционная гимнастика (на четвереньках - чтобы матка отклонялась вперед и вниз, освобождая мочеточник и улучшая отток мочи из почки). 5. УЗИ контроль почек в 32 и 36-37 недель, другие обследования - по показаниям. Удачи!