Информационно-
консультативный портал
для урологических пациентов
03uro 18+

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Анастасия

Возраст: 42

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадеркина Виктория Анатольевна

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 28.01.2009 13:38:00

формирования заключения врача: 28.01.2009 16:57:00

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: https://www.03uro.ru/consultations/question/74375/answer/74376

Заключение врача

Уважаемая Анастасия!

1. По УЗИ нефроптоз не ставится, он только предполагается. Основанием для диагноза нефроптоза является экскреторная урография в положениях лежа и стоя.

2. Пиелоэктазия справа при беременности возникает из-за того, что правая почка наиболее подвержена изменениям при беременности (анатомическая особенность беременной матки – чаще откланяется вправо, сдавливая правый мочеточник, плюс гормоны беременной женщины расслабляют мочеточник, нарушая отток мочи из почки).

3. В Вашей ситуации надо обратиться к урологу, выполнить общий анализ мочи, посев мочи на флору, биохимический анализ крови (креатинин, мочевина). При нарастании гидронефроза - его разрешение (нефростомия, стентирование).

4. Сейчас - позиционная гимнастика (на четвереньках - чтобы матка отклонялась вперед и вниз, освобождая мочеточник и улучшая отток мочи из почки).

5. УЗИ контроль почек в 32 и 36-37 недель, другие обследования - по показаниям.

Удачи.