Информационно-
консультативный портал
для урологических пациентов
03uro 18+

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Светлана

Возраст: 53

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадеркина Виктория Анатольевна

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 17.02.2009 12:12:00

формирования заключения врача: 17.02.2009 14:28:00

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: https://www.03uro.ru/consultations/question/77424/answer/77425

Заключение врача

Уважаемая Светлана! С большое долей уверенности можно сказать, что у Вас имеет место стрессовое недержание мочи. Часто у женщин после родов возникает слабость мышц тазового дна, и к существующему у большинства женщин циститу присоединяется уже органический компонент – вероятнее всего, цистоцеле (это опущение мочевого пузыря, что еще называется опущением передней стенки влагалища, но в данном случае подчеркивается заинтересованность в процессе мочевыводящей системы. Цистоцеле может сопровождаться стрессовой инконтиненцией (недержанием) мочи, связанным с родовой травмой мышц таза и мочевого пузыря. В такой ситуации какие-либо консервативные методы лечения малоэффективны. На сегодняшний день хорошо зарекомендовавшим себя способом оперативного лечения недержания мочи является субуретральный слинг. Это ряд операций, смысл которых заключается в подвешивании уретры в виде гамака специальными синтетическими полосками (пропилен). Это TVT, TOT, IVS и др. Такие операции выполняются практически в амбулаторных условиях. Перед оперативным лечением необходимо выполнить КУДИ - комплексное уродинамическое исследование.

Если Вы нуждаетесь во "втором мнении" специалистов проекта UroWeb, хотите получить очную консультацию, пройти обследование и лечение в высокоспециализированных Центрах и медицинских учреждениях России, можете связаться со специалистами UroWeb по телефону "горячей линии" 8(905)74-32-833.

Удачи.