

# Телемедицинская консультация врача-уролога

#### Пациент:

Имя: Наталия

**Возраст:** 75

Пол: Женский

#### Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

### Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 17.02.2009 14:30:03

формирования заключения врача: 20.02.2009 11:06:10

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** https://www.03uro.ru/consultations/question/77556/answer/77557



## Заключение врача

Уважаемый Наталия! В лечении интерстициального цистита большое значение имеет внутрипузырная терапия, т. е. инстилляции. Ее можно применять и отдельно, и вместе с основным лечением. Из препаратов, вводимых в мочевой пузырь, наиболее применимы диметилсульфоксид (ДМСО), гепарин, гидрокортизон, лидокаин в различных сочетаниях и различных курсах введения. ДМСО является противовоспалительным средством, миорелаксантом и обезболивающим препрататом. Одним из новых препаратов для лечения интерстициального цистита является Элмирон. Однако, надо заметить, что положительные результаты лечения интерстициального цистита являются непродолжительными. Хорошим эффектом считается достижение длительной ремиссии. Пациенту могут быть предложены хирургические методы, такие как фульгурация - разрушение (коагуляция с помощью лазера или электрокаутеризации) патологически измененных тканей мочевого пузыря, хирургическая реконструкция – аугментационная цистопластика. Подробнее можете прочитать http://03uro.ru/uropedia/cystitis. Удачи!