Информационно-
консультативный портал
для урологических пациентов
03uro 18+

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Богдан

Возраст: 38

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадеркина Виктория Анатольевна

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 04.03.2009 14:16:00

формирования заключения врача: 04.03.2009 16:05:00

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: https://www.03uro.ru/consultations/question/79992/answer/79993

Заключение врача

Уважаемый Богдан! 1. При возможности наладьте регулярную половую жизнь, т. к. пока она будет нерегулярной, вряд ли первый половой акт у Вас будет продолжительнее. 2. Эффективность метода стоп-старт определяется индивидуально. Попробуйте. 3. Анестезирующие мази и крем снижают чувствительность головки полового члена, что вызывает удлинение времени полового акта. 4. Вам рекомендованы именно эти способы, т. к. они являются первой линии терапии преждевременной эякуляции и в ряде случаев позволяют дифференцировать ее причины. Если поведенческие методы и мази будут неэффективны, то требуется проведение урологического и невологического обследования. Удачи.