Информационно-
консультативный портал
для урологических пациентов
03 uro 18+

# Телемедицинская консультация врача-уролога

## Пациент:

**Имя:** Евгений

**Возраст:** 20

**Пол:** Женский

## Врач:

**ФИО:** Шадёркин Игорь Аркадьевич

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

## Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 04.03.2005 22:38:04

**формирования заключения врача:** 07.03.2005 15:54:42

## Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** https://www.03uro.ru/consultations/question/8196/answer/8197

## Заключение врача

Уважаемый Евгений! Отсутствие семяизвержения может встречаться при патологии шейки мочевого пузыря, в результате чего сперма во время выброса попадает не в мочеиспускательный канал, а в мочевой пузырь. Проверить это очень просто – надо сдать мочу (на общий анализ) после полового акта. Присутствие сперматозоидов в моче подверждается эту теорию. Для выяснения причины этого необходимо провести обследование: анализы на урогенитальную инфекцию, УЗИ (мочевого пузыря с определением количества остаточной мочи, предстательной железы, семенных пузырьков) или ТРУЗИ (трансректальное УЗИ), уретроцистоскопию (инструментальный осмотр внутренней поверхности уретры и мочевого пузыря). После этих обследования можно будет сделать предварительные выводы и определиться с дальнейшей тактикой.