

## Телемедицинская консультация врача-уролога

#### Пациент:

Имя: Наталия

Возраст: 54

Пол: Женский

### Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

#### Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 21.03.2009 12:50:28

формирования заключения врача: 24.03.2009 11:15:19

### Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: https://www.03uro.ru/consultations/question/82913/answer/82914



# Заключение врача

Уважаемая Наталия! Прежде, чем подвергать себя инваивным методам необходимо дополнительно выполнить: 1. Обследовать на ЗППП полового партнера. 2. Также нужен осмотр на кресле на предмет диспозиции уретры (слишком низкого ее расположения по отношению к влагалищу, в результате чего выделения из влагалища и области промежности во время полового акта попадают на уретру и потом в мочевой пузырь). Если это подтвердится, то Вам рекомендуют или оперативное лечение - транспозицию уретры или постоянный прием малых доз уросептиков после каждого полового акта. 3. Посев мочи на флору, посев мочи на микобактерии туберкулеза, моча на атипичные клетки, КУДИ - комплексное уродинамическое исследование. 4. Можете обратиться на очный прием к специалистам урологам (Москва), все организационные вопросы решите по телефону 8(905)74-32-833. Удачи. Удачи!