Информационно-
консультативный портал
для урологических пациентов
03 uro 18+

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: галина

Возраст: 65

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадеркина Виктория Анатольевна

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 08.04.2009 21:31:29

формирования заключения врача: 09.04.2009 09:43:39

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: https://www.03uro.ru/consultations/question/85889/answer/86117

Заключение врача

Уважаемая Галина! Вам необходимо прислушаться к мнению своих врачей. Пиелоэктазия - расширение лоханки почки, тем более двусторонняя, требует диагностики и выяснения причины. Это может быть пузырно-мочеточниковый рефлюкс, стриктуры лоханочно-мочеточниковых сегментов, др. врожденные патологии. Внутривенная урография в Вашем случае позволит установить диагноз и определиться с дальнейшей тактикой. Пиелоэктазия может прогрессировать, перейти в гидронефроз, сопровождаться хроническим пиелонефритом, что в конечном счете повлечет снижение функции почек. В данном случае урография незаменима другими методами. Удачи.