Информационно-
консультативный портал
для урологических пациентов
03uro 18+

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Раиля

Возраст: 20

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 28.03.2005 14:44:35

формирования заключения врача: 28.03.2005 20:59:27

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: https://www.03uro.ru/consultations/question/8632/answer/8633

Заключение врача

Уважаемая Раиля! При беременности существует ряд физиологических изменений, которые не самым лучшим образом влияют на организмы матери и ребенка. Дело в том, что гормоны, продуцируемые в период беременности, вызывают расширение и снижение тонуса (атонию) мочеточников; позже беременная матка растет, отклоняется немного вправо, сдавливая правый мочеточник. Все это ведет к нарушению оттока мочи (т. е. расширению лоханок), активизации патогенной флоры, и, соответственно, имеет самые неблагоприятные последствия для матери и ребенка. На сроке 27 недель расширение лоханки справа до 11 мм – это допустимое явление. Вам необходимо обратиться к урологу и всю беременность быть под его наблюдением, сделать общий анализ мочи, посев мочи на флору и чувствительность к антибиотикам, анализ мочи по Нечипоренко. Дальнейшая тактика - по результатам Вашего самочувствия и результатам анализов. Пишите, если что.