Информационно-
консультативный портал
для урологических пациентов
03 uro 18+

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: наташа

Возраст: 54

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадеркина Виктория Анатольевна

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 09.04.2009 14:40:00

формирования заключения врача: 09.04.2009 15:02:00

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: https://www.03uro.ru/consultations/question/86454/answer/86455

Заключение врача

Уважаемая Наташа! Проба Реберга -Тареева сдается следующим образом. Во время выполнения пробы нельзя принимать медикаменты, влияющие на диурез, и нужно избегать физических нагрузок; пить можно, как при обычном питьевом режиме.

Проведение пробы:

1. пробу необходимо проводить утром натощак
2. перед проведением пробы необходимо освободить мочевой пузырь: дома нужно помочиться (в унитаз) и отметить время, когда это произошло (часы и минуты)
3. сразу после мочеиспускания выпить 400-500 мл воды или слабого чая
4. через 1 час прийди в ДЦ и сдать венозную кровь на креатинин
5. еще через 1 час (т.е. через 2 часа после мочеиспускания) собрать мочу - всю порцию (можно в условиях ДЦ), и сдать ее
6. сообщить регистратору свой рост и вес.

Удачи.