Информационно-
консультативный портал
для урологических пациентов
03uro 18+

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Лариса

Возраст: 66

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадеркина Виктория Анатольевна

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 19.05.2009 15:00:00

формирования заключения врача: 19.05.2009 15:08:00

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: https://www.03uro.ru/consultations/question/92305/answer/92306

Москва, 2025

Заключение врача

Уважаемая Лариса! Смотря чем обусловлено у Вас недержание мочи.

- если у Вас гиперактивный мочевой пузырь или сочетанное недержание, то терапия консервативная.

- если недержание мочи принапряжении (стрессовая инконтиненция), то лечение только оперативное. На сегодняшний день хорошо зарекомендовавшим себя способом оперативного лечения недержания мочи является субуретральный слинг. Это ряд операций, смысл которых заключается в подвешивании уретры в виде гамака специальными синтетическими полосками (пропилен). Это TVT, TOT, IVS и др.

Чтобы выяснить, какой тип недержания мочи именно у Вас, нужно обследование: дневник мочеиспускания, осмотр уролога на кресле, выполнение специальных тестов, КУДИ (комплексного уродинамического исследования).

Дополнительно потребуются общеклинические анализы - ЗППП, посев мочи на флору, ОАМ.

Можете обратиться на очный прием к специалистам урологам (Москва), все организационные вопросы решите по телефону 8(905)74-32-833.

Удачи.