Информационно-
консультативный портал
для урологических пациентов
03uro 18+

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Ксения

Возраст: 41

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадеркина Виктория Анатольевна

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 08.06.2009 04:36:38

формирования заключения врача: 08.06.2009 21:33:12

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: https://www.03uro.ru/consultations/question/94767/answer/94768

Заключение врача

Уважаемая Ксения! На мой взгляд, Вам не проведено обследование, которое позволило бы выяснить причину данных симптомов. По крайней мере, "анализы в норме(кровь, моча)" - этого недостаточно. 1. Для уточнения диагноза и определения дальнейшей тактики Вам необходимо обследоваться под контролем уролога: на урогенитальную инфекцию (хламидии, трихомонады, гарднереллы, микоплазмы, кандиды, уреаплазмы); повторить общий анализ мочи; посев мочи на флору и чувствительность к антибиотикам; УЗИ (почек, мочевого пузыря с определением количества остаточной мочи), КУДИ - комплексное уродинамическое исследование. 2. Возможно, потребуется выполнение цистоскопии. 3. Также нужен осмотр на кресле на предмет диспозиции уретры (слишком низкого ее расположения по отношению к влагалищу, в результате чего выделения из влагалища и области промежности во время полового акта попадают на уретру и потом в мочевой пузырь). Если это подтвердится, то Вам рекомендуют или оперативное лечение - транспозицию уретры или постоянный прием малых доз уросептиков после каждого полового акта. Конечно, это обследование потребует времени, но, чтобы не мучаться всю жизнь, стоит нормально обследоваться и пролечиться. Удачи.