Информационно-
консультативный портал
для урологических пациентов
03 uro 18+

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Наталья

Возраст: 42

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадеркина Виктория Анатольевна

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 16.06.2009 23:24:01

формирования заключения врача: 16.06.2009 23:29:29

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: https://www.03uro.ru/consultations/question/95732/answer/95734

Москва, 2025

Заключение врача

Уважаемая Наталья! Пиелоэктазия - это не диагноз, а УЗИ-признак расширения почечной лоханки. Ребенку необходимо обследоваться (выполнить экскреторную урографию с микционной цистографией), чтобы выяснить причину расширения - врожденный гидронефроз, пузырно-мочеточниковый рефлюкс, стриктура лоханочно-мочеточникового сегмента и т.д. В зависимости от этого будет определена дальнейшая тактика - наблюдение, консервативное или оперативное лечение. Если есть пиелоэктазия, то будет существовать и хронический рецидивирующий пиелонефрит (вследствие нарушения оттока мочи), который может приводить к сморщиванию почки, развитию хронической почечной недостаточности, т. е. постепенному снижению функции почки. Поэтому отнеситесь серьезно к этой проблеме. Проконсультируйте ребенка у грамотного детского уролога. Удачи.