Информационно-
консультативный портал
для урологических пациентов
03 uro 18+

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Марина

Возраст: 21

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 24.11.2003 12:00:00

формирования заключения врача: 24.11.2003 12:00:00

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: https://www.03uro.ru/consultations/question/978/answer/979

Заключение врача

Уважаемая Марина! Гипоплазия почки – это уменьшение размеров почки с частичным сохранением ее функции. С подобным состоянием благополучно живут и здравствуют много мне знакомых пациентов. У некоторых людей бывает даже врожденное отсутствие одной почки (аплазия, агенезия), что также им не мешает жить и работать. Естественно, среди них имеются и больные люди. В 27 недель беременности очень сложно достоверно оценить как размеры самих почек, так и их дальнейшее развитие. Впереди ещё 13 недель беременности. За этот срок внутренние органы младенца будут ещё развиваться. Неоплазия - это злокачественное перерождение почки. Я не знаю достоверно доказанной связи между гипоплазией и неоплазией. Если у ребенка нет генетических заболеваний, что можно установить в генетической консультации, и беременность желанна, я думаю, что ее стоит сохранить. Единственное, что я могу Вам посоветовать, это наблюдать ребенка у уролога. Удачи Вам!