Информационно-
консультативный портал
для урологических пациентов
03 uro 18+

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Александр Борисович

Возраст: 21

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 25.11.2003 12:00:00

формирования заключения врача: 25.11.2003 12:00:00

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: https://www.03uro.ru/consultations/question/986/answer/987

Москва, 2025

Заключение врача

Уважаемый Александр Борисович! Такими симптомами могут проявляться некоторые неотложные урологические заболевания – уретриты (воспаление уретры), циститы (воспаление мочевого пузыря), простатиты (воспаление предстательной железы), пиелонефриты (воспаление чашечно-лоханочной системы почек) и др.. То, что существует воспалительный процесс и имеются симптомы общей интоксикации – это точно, но ГДЕ именно локализуется процесс, надо выяснить. Вам надо обследоваться: сдать общий анализ мочи; посев мочи на флору и чувствительность к антибиотикам; сделать УЗИ почек, мочевого пузыря, предстательной железы, органов мошонки; возможно, придется делать дополнительные обследования – уретроцистоскопию (инструментальный осмотр внутренней поверхности уретры и мочевого пузыря). В любом случае, Вам нужно обратиться к урологу по месту жительства для обследования и лечения. А пока, можно рекомендовать Вам следующие мероприятия:

- Диета - огранижение острого, соленого, пряностей, маринадов, исключение приема алкоголя
- Мочегонные травы
- Тимоген по 1 мл в/м - 10 дней
- Уросептики, чаще всего Фторхинолоны, либо по результатам посевов мочи на флору и чувствительность ее к антибиотикам (практически это один из следующих препаратов (но не все сразу): ципрофлоксацин по 250 мг 3 раза в день, пефлоксацин по 400 мг 2 раза в день в течение 10 дней и др.)
- Метронидазол по 500 мг 2 раза в сутки – 10 дней
- Свечи с индометацином по 1 св. в задний проход на ночь 10 дней
- Поливитамины по схеме, приложенной к препарату в течение 20-30 дней

Если будут ещё вопросы, пишите.