Информационно-
консультативный портал
для урологических пациентов
03uro 18+

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Макс

Возраст: 20

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 11.06.2005 07:18:57

формирования заключения врача: 12.06.2005 20:52:07

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: https://www.03uro.ru/consultations/question/9954/answer/9955

Заключение врача

Уважаемый Макс! Ваш вопрос необходимо задавать дерматологам (специалисты по кожным заболеваниям). Но, насколько мне известно, препарат обладает выраженной тератогенностью при употреблении его женщиной. При назначении его женщине детородного возраста необходимо убедиться, что пациентка проинформирована об опасности наступления беременности во время лечения Роаккутаном и в течение 1 месяца после его окончания. До начала терапии необходимо убедиться, что больная не беременна. Лечение начинают только на 2-й или 3-й день нормального менструального цикла. В течение месяца до начала лечения, во время лечения и в течение месяца после прекращения лечения больная должна применять эффективные методы контрацепции. В случае рецидивов заболевания пациентка должна соблюдать те же меры предосторожности. Данные меры предосторожности необходимы даже для тех женщин, которые обычно не пользуются противозачаточными средствами по причине бесплодия. С уважением.