

**СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЕВОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ
ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР.
ЛАБОРАТОРИЯ РАДИОИЗОТОПНОЙ ДИАГНОСТИКИ.**

Сцинтиграфия почек

Ф.И.О. Тодкий Т.О., 3 года

Дата: 18.02.11.

Введено внутривенно 25 МБк технемека.

Эквивалентная доза: в почках – 3,5 мЗв

В гонадах - 0,06 мЗв.

Категория «БД»

Исследование проводилось в **горизонтальном** положении пациента.

Получены сцинтиграфические изображения почек в задней, правой и левой боковых проекциях.

Топография: расположение обычное

Форма: типичная

Размеры функционирующей паренхимы:

Правая почка: 84 х 36 мм левая почка: 57 х 25 мм

Контуры: правой почки достаточно чёткие, ровные, левой - нечёткие


Накопление препарата: активное в правой почке, в левой – резко снижено. Объём функционирующей ткани левой почки составляет 15% от правой.

Распределение РФП: несколько неравномерное по диффузному типу в правой почке, в левой – выраженно неравномерное по диффузно-очаговому типу.

Участки функционирующей ткани чередуются со слабофункционирующими зонами.

Заключение: сцинтиграфическая картина умеренно выраженных диффузных изменений паренхимы правой почки, выраженных диффузно-очаговых изменений паренхимы, гипоплазия левой почки.

Врач-радиолог
Чичерина Л.А.



тел. 38 – 35 - 53
с 8.00 до 14.00